



4040 US 27 N. Suite A.
Sebring, FL. 33870
PH: 863-386-9111
FX: 863-386-9121
www.centralflhearing.com
cfhs@stratemail.net

Preparación Para Su Examen de VNG

Por favor discontinuar el uso de estos medicamentos por 48 horas antes del examen.

- Medicamentos para la alergia/ Antihistamínicos (Chlor-trimeton, Dimetapp, Benadryl, Actifed, Trimanic, Claritin... Y cualquier "over the counter" remedios para el catarro.
- Tranquilizantes (Valium, Librium, Atarax, Vaistaril, Seraz, Ativan, Librax, Tranxene, Xanax)
- Sedantes (Halcion, Restoril, Nembutal, Seconal, Dalmane, Y otros medicamentos que ayudan a dormir.
- Decongestionantes
- Pastillas para el dolor/analégesicos narcóticos (Codeine, Demerol, Phenaphen, Tylenol sin o con Codeína, Percocet, Darvocet, Percodan, Phenobarbital, Anti- Depresivos.
- Pastillas para la Dieta
- Nervio/ Relajantes Muscular (Flexeril, Robaxin, Valium)
- Pastillas para mareos (Antivert, Meclizine, Bonine, parches para los oídos.)
- Aspirinas o Aspirinas substitutas (Tylenol ect.)

Traiga con usted la lista de sus medicamentos actuales.

*****Si tienes alguna pregunta o Preocupación de la discontinuación de sus medicamentos, Por favor consulte con su doctor.**

Instrucciones Adicionales:

- Cara limpia, sin maquillaje
- No utilice lentes de contacto (traiga sus lentes)
- Ningun alimento sólido 3 horas antes de su examen. (Si su examen es durante las horas de la mañana, puede consumir un desayuno ligero. Si su examen es durante de las horas de la tarde consum un desayuno ligero y para el almuerzo meriende ligero también). **(Pacientes diabéticos pueden comer 2 horas antes).**
- Evitar la cafeína. No bebas café, o refrescos de cola después de la medianoche del día del examen.
- No bebidas alcohólicas o medicamentos líquidos que contengan alcohol 48 horas antes del examen.
- Por favor traiga un par de calcetines para su comodidad durante el examen.
- "Mantenimiento" medicamentos tal como corazón, presión, diabetes, o incautación deben ser tomados regularmente.
- Todos los medicamentos se puedan renudar después del examen.

****Los medicamentos como para el corazón, presión arterial, la diabetes, o la incautación debe ser tomado como NORMAL. (SI NO SE ENCUENTRA EN UNA diurético, DEJAR DE 24 HRS.)****

****Es normal sentirse un poco mareado después del examen, típicamente solo por un corto tiempo. Le animamos a que tienes a alguien que te acompañe a su cita. Sin embargo, si esto no es posible, el plan para permitir un extra de 15 a 30 minutos después de su examen y antes de salir de nuestra oficina.****

Una vez que su evaluación es completa, se enviará un informe a su médico de referencia.

**** Por favor, llame a su médico de referencia para programar una cita de seguimiento.****